

# Apomorfinpenna

## Indikationer:

- Kliniskt relevanta off-perioder trots optimerad oral behandling
- Informerad och motiverad patient
- Bra L-dopa/apomorfin-svar

## Kontraindikationer:

- Svårbehandlad autonom dysfunktion, terapiresistent hallucinos, konfusion eller demens
- Överkänslighet mot apomorfin
- Annan svår somatisk sjukdom

## Bedömning för ”baseline”:

- Läkare: Hb, Lpk, elektrolyt- och leverstatus
- Ssk vikt, videofilmning före/efter
- Usk BT liggande och stående efter 3 min.

## Generella principer vid terapistart:

- Oförändrad oral behandling.
- Innan utprovningen ska patienten ha fått recept på apomorfinpenna 10 mg/mL, recept på T. Domperidon 10 mg och hjälpmedelskort på injektionsnålar. Patienten tar med sig eget läkemedel och injektionsnålar till utprovningen.
- T. Domperidon 10mg 2x3 ges i minst 2 dygn innan apomorfin och fortsätts i minst en månad under apomorfinbehandlingen.
- Utprovning av apomorfin sker under den period som patienten har mest uttalade besvär med ”OFF” eller ”frysningar”. Första injektion startas med 1 mg apomorfin (0.1 mL). Om ingen effekt, ökas dosen med 1 mg (0.1 mL) till maximalt 5 mg/injektion (0.5 mL/injektion). Krävs högre dos än 5 mg krävs läkarbedömning av patienten och ställningstagande av läkare om utprovningen ska fortsätta med högre dos alternativt avbrytas.
- 15 min efter injektion kontrolleras BT i liggande och stående efter 2 min.
- 30 min efter varje given injektion bedöms patientens rörlighet med hjälp av TUG-test, hálstamp, fingerklappning och pronation/supination. Observera även patientens mimik och eventuell tremor.
- Var aktsam på biverkningar (illamående, blodtrycksfall, hallucinos, hudöverkänslighet) eller kraftig underdosering.
- Patienten för självskattningsprotokoll kontinuerligt.
- Personal gör objektiv skattning på parkinsonschema.

## Parkinsonsköterska på mott/avd:

- Ser vid behov till att apomorfinpenna Dacepton finns på mott.
- Ser till att recept/låneavtal (Dacepton) finns skrivet på apomorfinpenna.
- Ser till att recept finns skrivet på infusionslösning för apomorfinpenna 10 mg/ml.
- Registrerar patient i speciell fil under Parkinsonmapp i gemensamma dokument (inkl låneavtal vb). Har du ej tillgång till mappen lämna ett meddelande till parkinsonansvarig sköterska.

- 
- Rapporterar till ev. berörda vårdgivare.
  - Görs utprovningen på avd 75 ska parkinsonsköterskan på neuromottagningen kontaktas då hon följer upp patienten via telefon en vecka efter utskrivning från avdelningen.
  - Utlämnade hjälpmedel och hjälpmedelskort journalförs så att nya förskrivningar kan göras direkt från journaltexten.