

Kontrollprover vid tarmsmitta

Personer med gastroenteritsymtom (diarréer och kräkningar) ska inte vara på sin arbetsplats, i skolan eller på förskolan.

Riskyrke: 1) personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel.
2) personer som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar.

Till diagnoserna nedan följer en länk till respektive smittskyddsblad.

Smittämne	Normalfallet	Riskyrke	Förskolebarn
Amöbainfektion (gäller Entamoeba histolytica) Smittskyddsblad	Ett kontrollprov, tidigast en vecka efter avslutad behandling. Återgå till arbete vid symtomfrihet.	Ett kontrollprov, tidigast en vecka efter avslutad behandling. Återgå till arbete vid symtomfrihet.	Ett kontrollprov, tidigast en vecka efter avslutad behandling. Återgå till förskola vid symtomfrihet och om man kan övervaka god toalett/handhygien.
Campylobacter Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.
Cryptosporidium Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.
Giardia Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.	Ett kontrollprov ca tre veckor efter avslutad behandling. Återgå till förskola vid symtomfrihet och om man kan övervaka god toalett/handhygien.
EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli-infektion) Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	<i>Enbart stx1 utan HUS-koppling (och kan sköta toalett-/handhygien) – ingen kontrollodling.</i> <i>Med stx2 eller HUS-koppling – minst ett negativt prov innan återgång till arbete eller förskola.</i>	<i>Enbart stx1 utan HUS-koppling (och kan sköta toalett-/handhygien) – ingen kontrollodling.</i> <i>Med stx2 eller HUS-koppling – minst ett negativt prov innan återgång till arbete eller förskola.</i>

Salmonella Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Ett kontrollprov innan återgång till arbete.	Inget kontrollprov. Kan återgå till förskola om stabilt symtomfri och om man kan övervaka god toalett-/handhygien.
Tyfoid- och paratyfoidfeber (S.typhi och S.paratyphi) Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Tre negativa kontrollprov (högst ett prov per dag) innan återgång till arbete. Provtagning påbörjas tidigast en vecka efter avslutad antibiotikabehandling.	Tre negativa kontrollprov (högst ett prov per dag) innan återgång till förskola. Provtagning påbörjas tidigast en vecka efter avslutad antibiotikabehandling.
Shigella Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Om antibiotikabehandlad: minst ett negativt kontrollprov innan återgång till arbete. Utan antibiotikabehandling krävs tre negativa kontrollprover i följd, högst ett prov per dag.	Om antibiotikabehandlad: minst ett negativt kontrollprov innan återgång till förskola. Utan antibiotikabehandling krävs tre negativa kontrollprover i följd, högst ett prov per dag.
Yersiniainfektion Smittskyddsblad	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.	Inget kontrollprov.